

Használat előtt olvassa el a használati utasítást a címkén és győződjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!



ártalmas



környezeti veszély

Ártalmas (Xn), környezeti veszély (N)
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
 893 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
 kifejezetten veszélyes
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
R-mondatok:
R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas R41
 Súlyos szemkárosodást okozhat R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
S-mondatok:
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S13 Élelmszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni S25 Kerülni kell a szembe jutást S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edény/-csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

Különleges S-mondatok: SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolásához közevel ne szennyezze a vizeket!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
 ivóvízbázisok védőterületén tilos felhasználni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élmezés-egészségügyi várakozási idő (nap): szőlő 21; almatermésűek 10; őszibarack, kajszibarack 21; cseresznye, meggy, szilva 21; málna 5; héjas gyümölcsűek 21; paprika 7; paradicsom, tojásgyümölcs 7; uborka, cukkini 5, bab, borsó 5; burgonya 7.

Munkaegészségügyi övrendszabályok: védőruha, védőkalap, vegyi anyagok elleni zárt védőszemüveg, FFP2 részecskeszűrő felátlarc, vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyű, védőlábbeli.

Elsősegélynyújtás: mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújaor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: rézmérgezés, tüneti megfigyelő kezelés,
Ellenanyag: BAL, penicillamin

A növényvédő szer eltarthatósága: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 5 év.

A növényvédő szer és a hatóanyag gyártója:
 Nufarm GmbH & Co KG
 St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Ausztria

Az engedélykirat tulajdonosa és a készítmény hazai képviselete:
 Nufarm Hungaria Kft. H-1118 Budapest, Dayka G. u. 3.

Forgalmazza:
 Kwizda Agro Hungary Kft. H-1138 Bp, Váci út 135-139.
 Telefon: (36 1) 224-7300, E-mail: kwizda@kwizda.hu
 Honlap: www.kwizda.hu

**Kiszerelei: Farmmix Kft. H-4824 Szamosszeg,
 Nagydobosi út 1-2., Telefon: +36 44 580-015**

Felhasználására vonatkozó előírások

Kültúra	Felhasználható	Betegség
Szőlő	furtzarodásig	peronoszpora, orbánc
Almatermésűek	termésérésig	gombabetegségek (kivéve lisztharmat), tüzelhalás*
Csonthéjasok	virágzás végeig	bakteriumos ágelhalás
Őszibarack, kajszibarack, cseresznye, meggy, szilva		gombás eredetű ágelhalás, levéllyukacsosodás, monília, tafrina, gnomóniás betegség
Málna	virágzás végeig	level-és vesszőbetegségek
Héjas gyümölcsűek	gyümölcs növekedésig	bakteriumos betegségek, gombabetegségek
Zöldsegrétek		
paprika, uborka, cukkini, virágzásig		baktériumos betegségek, hüvelyesek
paradicsom, burgonya	termésérésig	gombabetegségek (kivéve lisztharmat)

Házikerti dózis: 2-3 dkg/10 liter víz.
***tüzelhalás ellen a dózis 3 dkg/10 liter víz**

Előírt növényvédelmi technológia

A készítményt fás szárú növények esetében gombás és baktériumos betegségek ellen, az őszi és a tavaszi időszakban lemosó permetezés formájában, a nem nyugalmi időszakban valamint lágy szárú növényeknél fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 3-21 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 3-5 alkalommal) célszerű alkalmazni. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor rövidebb permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetfedésre, még a lombzat belsejében is. **Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap):** málna, héjas gyümölcsűek, hüvelyesek, uborka, cukkini 5 nap; szőlő, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, burgonya 7 nap; almatermésűek 10 nap; csonthéjasok 21 nap.

A forgalmazó figyelmeztetése

A fajták rézérzékenységét a kezelések időpontjában figyelembe kell venni! Minden kombináció esetén a permetezőgéphez történő betöltés előtt keverési próbát kell elvégezni! A gyártó és a forgalmazó cég nem vállalhat felelősséget az ellenőrzése alá nem vonható tényezőkből (helytelen tárolás, rendkívüli időjárás, helytelen felhasználás, esetleg rezisztens károsítók megjelenése) eredő károkról.

Nettó tartalom: 20 g

Gyártási idő (nap/hónap/év) és gyártási szám a csomagolóburkolaton található

Forgalomba hozatali és felhasználási engedély száma: MgSZHK 02.5/12063-1/2010



CHAMPION[®] WG

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER, VÍZBEN DISZPERGÁLHATÓ GRANULÁTUM (WG)

Forgalmazási kategória: III. Hatóanyag: 77% rézhidroxid (500 g/kg fémréz)

Nettó tartalom: **20 g**

Gyermekek elől el kell zárni! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!